

كيف يتم فحص قسطرة القلب للطفل

- يتم اجراء فحص الدم وأشعة وتخطيط للطفل قبل يوم من اجراء القسطرة ويجب الا يكون الطفل مصاباً بنزلة برد او يعاني من السعال او الحرارة.
- لا يحتاج الطفل عادة التخدير عام وإنما التخدير موضعي وابرة مهدئه فقط.
- ان يكون الطفل صائم لمدة اربعة ساعات على الاقل قبل الفحص.
- خلال فحص القسطرة قد يحتاج طبيب التخدير لاعطاء الطفل جرعات من الادوية المهدئه حتى لا يتحرك خلال الفحص.
- يستغرق الفحص من ساعة الى ثلاثة ساعات وتعتمد على نوعية الفحص وحجم الطفل وقد تستغرق القسطرة عدة ساعات نتيجة صعوبة إيجاد وريد في الفخذ لإجرائها.
- بعد الفحص يعود الطفل للجناح ولا يحتاج الى عنابة مركزة ويكون هناك شاش ضاغط على مكان دخول القسطرة في أعلى الفخذ ولا يوجد آية غرز أو خياطة للجلد حيث لا تترك القسطرة أثراً.
- يمكن للطفل ان يتناول الماء او حليب دافئ بعد ساعتين الى اربع ساعات من الانتهاء (أي بعد انتهاء مفعول التخدير)
- يمكن خروج الطفل بعد ٢٤ ساعة من المستشفى.

ما هي مضاعفات قسطرة القلب

فحص قسطرة القلب آمن نسبياً حيث تصل نسبة المضاعفات ١ / ١٠٠٠ حاله وتزيد المضاعفات في الحالات التالية :

- ١ - صغّر عمر الطفل (المواليد).
- ٢ - وجود هبوط شديد بالقلب.
- ٣ - ارتفاع شديد في ضغط الرئة.
- ٤ - وجود مشاكل اخرى كامراض الكلى او عدم انتظام ضربات القلب.
- ٥ - القسطرة العلاجية التي تحتاج الى تفخ باللون او كوي الخ..

المضاعفات هي:

- ١ - عدم انتظام مؤقت في ضربات القلب (ويمكن علاج ذلك حسب الحالة)
- ٢ - نزيف من مكان القسطرة أعلى الفخذ.
- ٣ - انسداد أحد شريانين الفخذ.
- ٤ - انسداد في احد الشريانين بالجسم
- ٥ - حدوث التهاب في القلب بعد اجراء القسطرة وهذا لا يحدث في الوقت الحالي الا نادراً نتيجة التعقيم الجيد للادوات واستخدام قسطرة جديدة لكل مريض.
- ٦ - تجمع دموي حول القلب مما يسمى سحب ذلك التجمع بقسطرة أسفل الصدر

- ٧ - تشنجات مؤقتة وقد تحدث تشنجات في الطفل عقب القسطرة او بعض الاعراض العصبية وذلك نتيجة مرور كتله دموية صغيرة جراء (Thrombus) من الشريان الى المخ.
- ٨ - حدوث الوفاة وتحدث نتيجة احد المضاعفات ولحسن الحظ فان حدوث اي من

هذه المضاعفات نادر جداً (أي أقل من ١/١٠٠٠ حالة). والغرض من ايضاح احتمال حدوث هذه المضاعفات هو الاحاطة علماً بها وليس لغرض اثارة الذعر في نفوس الوالدين. ونأمل لكم الشفاء العاجل باذن الله.

