

ما هي انواع عمليات القلب:

عمليات القلب المفتوح :

وهي عمليات يقوم الجراح خلالها بوضع الطفل على جهاز التنفس والقلب الصناعي ويفتح القلب بعد فتح القفص الصدري لتعديل العيوب داخل القلب المختلفة ومعظم جراحات القلب هي من هذا النوع.

عمليات صفراء للقلب :

وهنا يقوم الجراح بإجراء عملية خارج القلب لأحد شرايين القلب. وتجري العملية من الصدر في الجهة اليسرى او اليمنى من الصدر تحت الابط وتتمدد للظهر

التحضير لإجراء عملية القلب:

- بعد ان يقوم أخصائي القلب بفحص الطفل وتشخيص الحالة واجراء سوناد وتخطسط للقلب واحياناً قسطرة للقلب سوف يحول الطفل الى جراح القلب الذي يعطي موعد للعملية ويكون ذلك إما موعد روتيني أو قد يحتاج الطفل لعملية مستعجلة للقلب تبعاً للحالة.

- تجري تحاليل شاملة للدم وأشعة للصدر جديدة قبل يوم من اجراء العملية ويتم تحضير كمية من الدم مناسبة لفصيلة دم الطفل.

- يجب ان يكون الطفل غير مصاب بنزلة برد او حرارة في اليوم السابق لاجراد العملية
- اذا كانت العملية روتينية وليست مستعجلة قد يضطر الجراح لالغاء العملية بعد اخذ التحاليل

من هو الفريق الذي يرعى الطفل المصاب بعيوب في القلب

١ - طبيب امراض القلب : وهو طبيب استشاري وظيفته فحص الطفل وتشخيص حالته اكلينيكيا وتحديد الفحوصات اللازمة له كتخطيط القلب والأشعة والسوونار وهو الذي يجري قسطرة القلب اذا دعت الحاجة ويحدد اذا كان الطفل يحتاج الى ادوية او اجراء عملية القلب.

وهو الطبيب المسؤول عن علاج الطفل قبل وبعد اجراء العملية الى مدى الحياة.

٢ - جراح القلب : وهو الطبيب الاستشاري الذي يقوم بإجراء جراحة للقلب وتحدد نوعيتها بناء على توصية طبيب القلب.

٣ - طبيب التخدير : وهو المسؤول عن تخدير الطفل خلال اجراء القسطرة او العملية الجراحية.

٤ - طبيب العناية المركزة : وهو الذي يتتابع حالة الطفل بعد اجراء العملية في العناية المركزة.

٥ - اخصائي العلاج الطبيعي : وهو المختص بإجراء العلاج الطبيعي للطفل بعد اجراء العملية للاسراع في الشفاء.

٦ - الممرضات المسؤولات.



جامعة القلب الكويتية



الدليل عمليات القلب الأطفال



إعداد / الدكتورة تولو أبو شعبان
استشارية أمراض القلب للأطفال
المستشفى الصدري

- هل يحتاج الجراح ليقاف القلب خلال العملية
قبل فتح القلب يتم تحويل الدم الى جهاز القلب الصناعي ويتم ايقاف القلب حتى يتمكن الجراح من فتحه واجراء الجراحة الالازمة وبعد ذلك يعاد مرور الدم للقلب وتعود الدورة الدموية لطبيعتها.

هل يشعر الطفل بالألم خلال او بعد اجراء عملية القلب؟

لا يشعر الطفل بألم خلال الجراحة وبعدها لعدة أيام أو ساعات عندما يكون على جهاز التنفس الصناعي وعندما يستيقن الطفل من المخدر يشعر بالألم نتيجة التئام جرح العملية كأي عملية أخرى ويحتاج أحياناً لبعض المسكنات.



مجمع الاوقاف برج ١٧ الدور السادس - مكتب ١٧
تلفون : ٢٢٤٦٧٩٨٣ - فاكس : ٢٢٤٦٧٩٨٢
Website : www.Khf.org.kw

٢ - اضطراب ضربات القلب : قد يحدث اضطراب ضربات القلب بعد اجراء العملية مما يستدعي وضع بطارية صناعية (Pace Make) وقد تكون مؤقتة لعدة ايام حتى تعود ضربات القلب لوضعها الطبيعي.

٣ - عدم انتظام حركة الحاجب الحاجز

ويحدث ذلك أحياناً نتيجة اصابة احد اجزاء العصب الذي يغذي الحاجب الحاجز وذلك قد يستدعي اجراء عملية لربط الحاجب الحاجز.

٤ - اللتهابات : قد تحدث نتيجة وجود الطفل في العناية المركزة ويحتاج الطفل عادة لمضاد حيوى لقتل الجراثيم المسيبة لذلك

٥ - حدوث فشل كلوي قد يحدث فشل كلوي مؤقت بعد العملية نتيجة ضعف مؤقت في عضلة القلب وقد يحتاج الطفل لعملية غسيل الكلي مؤقت وحالما ترجع عضلة القلب لطبيعتها تعود وظائف الكلى نتيجة.

٦ - تلف بالدماغ : قد يحدث ذلك نتيجة نقص الاكسجين او الدم للمخ خلال العملية مما يؤدي الى تلف جزء بسيط من المخ او الى تلف كامل. وهذه هي اصعب المضاعفات التي قد تحدث وهي من المضاعفات التي تقلق الطبيب والاهل سواء ومن حسن الحظ ومع توفر الاجهزه الحديثة تم التقليل من حصول هذه المشكلة وقد يحدث تشنجات مؤقتة احياناً يمكن علاجها بالأدوية

و التحضير بذلك بوجود حالة طارئة لطفل مريض يحاج لجراحة عاجلة وننمني تعاؤنكم معنا في هذه الظروف.

- يتم تحضير سرير للطفل في العناية المركزة حتى ينتقل اليه بعد اجراء العملية . وقد يبقى الطفل في العناية المركزة لعدة ايام تبعاً لحالته ويقوم طبيب العناية المركزة برعايته في تلك الفترة.

- يحتاج الطفل لعدة أيام في الجنح بعد خروجه من العناية المركزة قبل خروجه من المستشفى .

- يعطي الطفل بعد خروجه من المستشفى الأدوية الالازمة وموعود لزيارة اخصائي القلب في العيادة الخارجية.

كم يستغرق اجراء عملية القلب؟

تحتاج عمليات القلب المفتوح من ثلاثة الى أربع ساعات وقد تستمر لأكثر من ذلك.

ماهي مضاعفات عمليات القلب

مع تطور الطب أصبحت عمليات القلب المفتوحة والعمليات الصغرى للقلب قليلة الخطورة مقارنة بالسنوات الماضية. والجراح هو الذي يحدد نسبة خطورة العملية. ويعتمد ذلك على نوعية العملية وعمر الطفل ووجود مشاكل اخرى قبل اجراء العملية.

١ - التزييف: وقد يحدث التزييف مباشرة بعد العملية مما يستدعي اعادة الطفل لغرفة العمليات او بعد ايام ولذلك يحتاج الطفل لكميات من الدم قبل اجراء العملية كإجراء العملية كإجراء احتياطي.